

Arterite a cellule giganti						
Inclusione Dopo la diagnosi o una ricaduta, le visite sono consigliate ogni tre mesi per un anno.		Controllo annuo L'SCQM raccomanda di effettuare un'ispezione almeno una volta all'anno.		Controllo intermedio Raccomandato in caso di variazione dell'attività della malattia, di modifica della terapia o se i dati del registro vengono utilizzati per la gestione della malattia.		Autocontrollo mySCQM Le voci di mySCQM tra una visita e l'altra
Medico	Paziente	Medico	Paziente	Medico	Paziente	Paziente
<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche malattia • Comorbidità • Dati clinici • Laboratorio • Terapia medicamentosa <p>Scores: Tutti i punteggi calcolati sono elencati nel foglio supplementare.</p> <p>Opzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campioni biologici • Effeto collaterale 	<ul style="list-style-type: none"> • SF-12 	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche malattia • Comorbidità • Dati clinici • Laboratorio • Terapia medicamentosa <p>Scores: Tutti i punteggi calcolati sono elencati nel foglio supplementare.</p> <p>Opzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campioni biologici • Effeto collaterale 	<ul style="list-style-type: none"> • SF-12 	<ul style="list-style-type: none"> • Comorbidità • Dati clinici • Laboratorio • Terapia medicamentosa <p>Opzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campioni biologici • Effeto collaterale 	<ul style="list-style-type: none"> • SF-12 	<ul style="list-style-type: none"> • NSAID • Conformità alla DMARD • Assunzione di steroidi