

## Calcolo e dichiarazione dei punteggi

Score	Dichiarazione	Ingresso tramite	Gamma	Etichetta del scoreboard	Coorte	Commento
SJC	Swollen joint count (28 articolazioni): somma del numero di articolazioni gonfie.	Il medico	0 - 28		AR	Non appena un'articolazione viene contrassegnata come patologica (1/rosso = interessato), viene calcolato il punteggio, indipendentemente dal fatto che tutte le articolazioni siano state compilate.
TJC	Tender joint count (28 articolazioni): somma del numero di articolazioni dolenti alla pressione.	Il medico	0 - 28		AR	
Articolazioni gonfie 44	Articolazioni gonfie sulla base di 44 articolazioni	Il medico	0 - 44		axSpA	
Articolazioni dolorose 44	Articolazioni sensibili al dolore basate su 44 articolazioni	Il medico	0 - 44		axSpA	
Articolazioni gonfie. 68	Articolazioni gonfie sulla base di 68 articolazioni	Il medico	0 - 68		APs	
Articolazioni dolorose 68	Articolazioni sensibili al dolore sulla base di 68 articolazioni	Il medico	0 - 68		APs	
Entesiti	Somma del numero di entesitidi.	Il medico	0 - 15		axSpA APs	
DAS28(3) BSR	è calcolato in base al numero di articolazioni gonfie, di articolazioni dolenti alla pressione e al valore della BSR. Intervallo 0 - 9,4	Il medico	0 - 9.4	Rosso > 5,1 Arancione > 3,2-5,1 Giallo 2,6-3,2 Verde < 2,6	AR APs	I punteggi DAS sono calcolati anche con un set di dati incompleto

Score	Dichiarazione	Ingresso tramite	Gamma	Etichetta del scoreboard	Coorte	Commento
DAS28(3) CRP	è calcolato in base al numero di articolazioni gonfie, di articolazioni dolenti alla pressione e al valore della CRP. Intervallo 0 - 9,4	Il medico	0 - 9.4		AR APs	(vedi articolazioni gonfie e dolorose).
DAS28(4) BSR	Calcolato in base al numero di articolazioni gonfie, di articolazioni dolenti alla pressione, al valore della BSR e alla valutazione globale dell'attività della malattia da parte del paziente. Intervallo 0 - 9,4	Il medico	0 - 9.4		AR APs	
DAS28(4) CRP	Calcolato in base al numero di articolazioni gonfie, di articolazioni dolenti alla pressione, al valore della CRP e alla valutazione globale dell'attività della malattia da parte del paziente. Intervallo 0 - 9,4	Il medico	0 - 9.4		AR APs	
Glob. Att.Malat.	Valutazione globale dell'attività della malattia da parte del medico. (0-10)	Il medico	0 - 10		AR RZA NCA	
RADAI-5	Rheumatoid Arthritis Disease Activity Index-5, questionario per il rilevamento del grado di artrite (artropatia infiammatoria). Il punteggio può assumere valori compresi tra 0 e 10. Un punteggio di più basso indica un grado inferiore.	Paziente	0 - 10		AR	
HAQ	"Health Assessment Questionnaire", questionario per il rilevamento di eventuali disabilità causate da un'artropatia reumatica infiammabile. Il punteggio più basso significa che la disabilità è assente o lieve.	Paziente	0 - 3		AR APs	

Score	Dichiarazione	Ingresso tramite	Gamma	Etichetta del scoreboard	Coorte	Commento
BASMI	Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index è una misura della mobilità spinale. 5 misure di mobilità particolarmente significative che vengono combinate in un numero il cui valore calcolato è compreso tra 0 (nessuna restrizione) e 10 (restrizione molto grave).	Il medico	0 - 10		axSpA	
BASFI	Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index, questionario per il rilevamento del grado della disabilità causata da spondiloartrite assiale. Il punteggio può assumere valori compresi tra 0 e 10. Un punteggio più basso indica un grado di disabilità inferiore.	Paziente	0 - 10		axSpA	
BASDAI	Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, questionario per il rilevamento del livello di attività della spondiloartrite. Il punteggio può assumere valori compresi tra 0 e 10. Un punteggio più basso indica un livello di attività inferiore.	Paziente	0 - 10		axSpA	
ASAS-HI	Assessment of SpondyloArthritis international Society Health Index, questionario per la valutazione dello stato di salute nei pazienti affetti da spondiloartrite. Il punteggio può assumere valori compresi tra 0 e 17. Un punteggio più basso indica un migliore stato di salute.	Paziente	0 - 17		axSpA	
ASDAS	Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score, che in parte si basa sulle risposte al questionario BASDAI e in parte sul valore di laboratorio CRP, di conseguenza misura in modo più accurato il livello di attività della malattia rispetto al solo BASDAI. Il punteggio assume generalmente valori compresi tra 1 e 4. Un punteggio più basso indica un livello di attività inferiore	Paziente e medico		Rosso > 3,5 Arancione 2,1 - 3,5 Giallo 1,3 - 2,0 Verde < 1,3	axSpA	

Score	Dichiarazione	Ingresso tramite	Gamma	Etichetta del scoreboard	Coorte	Commento
DLQI	Dermatology Life Quality Index, questionario per il rilevamento di eventuali disabilità causate da patologie cutanee. Il punteggio può assumere valori compresi tra 0 e 30. Un punteggio più basso indica nessuna o una lieve riduzione della qualità della vita	Paziente	0 - 30		APs	
MDA	"Minimal Disease Activity" è raggiunta quando sono soddisfatti almeno 5 dei 7 criteri seguenti: articolazioni pressate $\leq 1$ , articolazioni gonfie $\leq 1$ , valutazione globale del medico del coinvolgimento cutaneo $\leq$ "quasi nessuno", dolore articolare VAS $<15$ (paziente), malattia glob. Atto. VAS $< 20$ (paziente), HAQ 0-3 $\leq 0,5$ (paziente), entesitidi $\leq 1$	Paziente e medico		Verde: almeno 5 criteri positivi Rosso: $< 5$ criteri positivi Nessuna etichetta: numero insufficiente di criteri registrati	APs	
SF 12: PCS	Short-form 12: Physical Component Score, questionario sulla salute fisica generale. Sono possibili punteggi compresi tra 20 e 60. Un PCS più alto significa una migliore qualità di vita fisica.	Paziente	20 - 60		AR APs axSpA	
SF 12: MCS	Short-form 12: Mental Component Score, questionario sulla salute mentale generale. Il punteggio può assumere valori compresi tra 20 e 60. Un MCS più alto significa una migliore qualità di vita mentale.	Paziente	20 - 60		AR APS axSpA	
GPAQ	Global physical activity questionnaire sta per "attività fisica globale" e traccia il livello di attività del paziente. Non c'è un valore massimo, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda un valore minimo di 600.	Paziente			AR APs axSpA	

Score	Dichiarazione	Ingresso tramite	Gamma	Etichetta del scoreboard	Coorte	Commento
NSAID Score	Il NSAID Score (non-steroidal anti-inflammatory drug) indica il numero di antidolorifici antinfiammatori assunti nelle ultime due settimane. Più alto è il valore, più antidolorifici sono stati assunti in questo periodo. Un valore pari a 0 significa nessun dosaggio di antidolorifici, mentre un valore pari a 100 significa un dosaggio elevato di antidolorifici.	Paziente	0 - 100		AR ACG PMR NCA	
EuroQoL	è un questionario sulla qualità della vita sviluppato per studi socio-economici dal gruppo EuroQol. Il punteggio viene calcolato inserendo lo stato di salute attuale del paziente (nessun problema, moderato e grave) per ciascuna delle 5 categorie. L'EuroQol può assumere valori compresi tra -7,4 (stato di salute peggiore) e 100 (stato di salute migliore). Il valore della valutazione dello stato di salute generale (scala 0-100) non è incluso nel calcolo del punteggio EuroQol.	Paziente	-7.4 - 100		AR APS axSpA	
Ratingen Completo	(Rx) Vengono scansionate 38 regioni delle mani e dei piedi alla ricerca di erosioni. A ciascuna regione viene assegnato un punteggio compreso tra 0 e 5. Il punteggio è la somma dei punteggi delle singole regioni articolari.	Dipendenti di SCQM	0 - 190		AR	
Ratingen Mano	(Rx) Score di Ratingen relativo alle sole mani.	Dipendenti di SCQM	0 - 140		AR	
Ratingen Piede	(Rx) Score di Ratingen relativo ai soli piedi.	Dipendenti di SCQM	0 - 50		AR	
mNYC	(Rx) Indica se c'è un coinvolgimento dell'ISG secondo i criteri di New York modificati.	Dipendenti di SCQM	positivo o negativo		axSpA	

Score	Dichiarazione	Ingresso tramite	Gamma	Etichetta del scoreboard	Coorte	Commento
mSASSS	(Rx) Misura la progressione del coinvolgimento spinale nei pazienti con axSpA. Punteggio compreso tra 0 e 3 per 24 sedi nella colonna vertebrale cervicale e lombare.	Nel contesto degli studi degli esperti	0-72		axSpA	