

Ce résumé informel a été créé à l'aide de ChatGPT (version GPT-4o), approuvé par le chef de projet et traduit à l'aide de DeepL.com.

Évolution des prescriptions d'inhibiteurs de la Janus kinase (JAKi) depuis 2015 dans le cadre d'une collaboration internationale entre registres de la polyarthrite rhumatoïde (étude « JAK-pot ») : impact des mises en garde réglementaires

Cette étude a examiné l'influence des mises en garde relatives à la sécurité sur l'utilisation des inhibiteurs de la Janus kinase, ou inhibiteurs JAK, chez les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. À partir des données issues de 12 registres nationaux, les chercheurs ont analysé plus de 55 000 cycles de traitement chez plus de 40 000 patients entre 2015 et 2024. Dans l'ensemble, l'utilisation des inhibiteurs de JAK a fortement augmenté, passant de moins de 1 % des traitements en 2015 à plus de 20 % en 2024. Cependant, cette croissance s'est ralentie à la suite d'avertissements majeurs émis par les autorités réglementaires en matière de sécurité, notamment concernant les événements cardiovasculaires, le cancer, les caillots sanguins et les décès. Le tofacitinib a été le plus touché, avec une baisse du nombre de nouvelles mises sous traitement et une augmentation des arrêts de traitement à la suite de ces avertissements clés. Les changements ont été moins marqués pour les autres inhibiteurs de JAK.

Ces résultats sont importants car ils montrent que les communications réglementaires en matière de sécurité influencent les pratiques de prescription dans la vie réelle. Pour les rhumatologues, cette étude souligne la nécessité d'évaluer soigneusement les facteurs de risque individuels avant d'instaurer ou de poursuivre un traitement par inhibiteurs de JAK. Pour les patients, elle plaide en faveur d'une prise de décision partagée qui mette en balance les bénéfices du traitement et les risques potentiels pour la sécurité.

Lien vers la publication: Evolution of Janus Kinase inhibitors (JAKi) prescriptions since 2015 in an international collaboration of rheumatoid arthritis registers (the 'JAK-pot' study): effect of regulatory warnings at <https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2026.152946>